

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS,

- Las personas con alguna referencia sobre la tuberculosis en el año 2013 tienen un mayor peso con relación a la población total que en el 2009, pasando de 92,4% en el 2009 al 93,2% en el 2013. Por grupo de edades, el comportamiento es similar, excepto en los grupos de 50-59 años y 60 y más.
- Por sexo, en el año 2013 se mantiene igual situación que en el 2009, donde el porcentaje de mujeres que han escuchado hablar sobre la tuberculosis es superior al de los hombres. Esta situación es similar en los municipios de alto, mediano y bajo riesgo.
- Por color de la piel, no se constatan diferencias apreciables en cuanto a las personas con alguna referencia sobre la TB en ninguna de las encuestas realizadas.
- Atendiendo al nivel educacional de las personas que tienen alguna referencia sobre la TB, la situación es similar a la del 2009, en cuanto a que los mayores por cientos se localizan en el nivel medio superior- superior, seguidos del nivel medio y por último primaria o menos.
- En lo que se refiere a la situación de actividad de los que han escuchado hablar de la tuberculosis, las mayores proporciones tanto en el país como en los municipios de alto, mediano y bajo riesgo, se localizan en las categorías de “trabajador o buscando empleo”, seguidos de los “quehaceres del hogar” y los “pensionados o jubilados”.
- En el año 2013, el 82,0% o más de la población con alguna referencia sobre la tuberculosis, es capaz de identificar que puede causar la muerte, es curable o es contagiosa.
- En el 2013, crece el número de personas con alguna referencia sobre la tuberculosis, que identifican de conjunto que la tuberculosis puede causar la muerte, es curable y contagiosa, 72.4%, ligeramente superior al 2009.
- La identificación, por parte de la población con referencia de la tuberculosis, del contacto frecuente con secreciones respiratorias de un enfermo de TB pulmonar como vía de transmisión de la enfermedad, se mantiene alrededor del 90% en las encuestas realizadas.
- La tos crónica y la sangre en el esputo; son los síntomas del estado avanzado de la enfermedad más identificados por la población que ha escuchado hablar de tuberculosis. La fiebre por más de dos o tres semanas de duración, el cansancio y la pérdida de peso, son los síntomas del estado inicial de la enfermedad más identificados por esta población.
- La población con conocimiento básico y conocimiento integral rondan el 50% de aquella que tiene alguna referencia sobre la tuberculosis, lo que significa que existen brechas importantes en el conocimiento de diferentes aristas de la enfermedad y sobre todo en su totalidad.
- En ambas encuestas, las dos principales vías de información sobre la tuberculosis son las mismas: “La televisión” y “Familiares, amigos o vecinos”.
- Es destacable como en el 2013, los “Materiales promocionales sobre la tuberculosis (carteles, afiches, almanaques, etc)”, pasan de un séptimo lugar en el 2009, a un cuarto lugar, lo que es indicativo de las acciones desplegadas por el proyecto en esta dirección. Al mismo tiempo “Acciones de personal de la salud”, crece de manera absoluta y relativa, pasando del sexto lugar en el 2009 al tercero en el 2013.

- El componente afectivo de la población de 12 años y más con alguna referencia de la TB, hacia personas que padecen la enfermedad, en el 2013, muestra de manera general resultados positivos, ejemplificado en que algo más del 80,0% de población siente deseo de ayudar a los enfermos de TB. Es destacable el decrecimiento en la estructura de la categoría “Siento compasión” por los enfermos de tuberculosis, tanto de manera global como por estratos de riesgo.
- Del total de personas que han escuchado hablar de la TB, el 61,4% piensa que puede contraer esta enfermedad. En el año 2009 esta cifra fue de 52,6%, lo que en cifras absolutas representa un incremento entre uno y otro año de 844 278 personas. De estas personas, el 88,4% acudirían al médico al sospechar que se encuentran enfermas de tuberculosis, para un incremento de 434 388 personas con relación al 2009. Si la persona es diagnosticada, el 85,0% de la población con alguna referencia de la TB contestó que realizarían el tratamiento indicado por el médico.